ROSA RUBIGINOSA

(aculeatissima.

R. germinibus subovatis pedunculisque hispidis; foliolis subrotundis, supra subpubescentibus, subtus margineque glandulosis; caule aculeis inæqualibus confertissimis subrectis; floribus 2 – 3 subcorymbosis. (N.)

R. Rubiginosa aculeatissima. Dv P. Gym. Rosarum, in Thy. R. Candolleana, p. 13, sp. 2, var. 4. Thy. Prod. de la Mon. du genre Rosier, p. 110, groupe 20, var. 8.

LE ROSIER ROUILLE

(à tiges très-épineuses.)

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau s'élève en un buisson toussu à la hauteur de quatre pieds, au plus. Ses branches sont hérissées d'un grand nombre d'aiguillons inégaux, sermes, rapprochés entre eux, la plupart presque droits. Les seuilles se composent de sept, rarement de neuf solioles, un peu visqueuses, ovales-arrondies, ségèrement pabescentes en-dessus, à dentelure double et glanduleuse: elles sont portées par un pétiole pubescent, chargé de glandes, garni de quelques petits aiguillons crochus, ayant

(1) Prodrome de la Monographie des espèces et variétés du genre Rosier, divisées selon leur ordre naturel, avec la synonymie, les noms vulgaires, un tableau synoptique, et deux planches gravées en couleur. Ouvrage utile aux botanistes-cultivateurs, pour l'arrangement méthodique de ces arbrisseaux dans les grandes collections, et aux pépiniéristes pour répondre aux demandes qui leur seraient faites. Par Clande-Antoine Thorax, i vol.



Rosa/rubiginosa/aculeatifsima/. Rosier rouille/ très épineux/.

P. I. Redouté pina.

Imprimerie de Remond.

Chapuy Sculp

mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 290 200 200